

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Nizhny Novgorod Regional Children's Teaching Hospital

603136 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 211
тел/факс: (8-8312) 175-684

603136 N.Novgorod, Vaneeva st.211
Tel/Fax (8-8312) 175-684

Исх.№ _____ от «15 _____» 09 2004

Русалева Дарья, 1г 2мес., находилась в отделении онкологии

С 13.09.04 по 21.09.04г Диагноз : Нейробластома забрюшинного пр-ва я.

Из анамнеза: родилась от молодых здоровых родителей, беременность протекала на фоне аппендэктомии в 25 недель, анемии, ОРЗ, сотрясения головного мозга, ВСД по кардиальному типу. Роды в срок. Вес при рождении 3500.Росла и развивалась по возрасту. Настоящее заболевание со слов мамы, началось в конце марта 2004г, когда на фоне повышения температуры в анализе мочи появились соли (фосфаты и оксалаты) в большом количестве, следы белка. Поставлен диагноз дисметаболическая нефропатия. В поликлинике ГУ «НОДКБ» 10.09.04 выполнено УЗО живота и выявлена солидное образование забрюшинного пространства справа (больше денных за образование правого надпочечника), госпитализирована в отделение онкологии.

В отделении проведено обследование включающее. КТ брюшной полости. Заключение рентгенолога - картина объемного образования забрюшинного пространства (нейробластома). По УЗО от 17.09.04 визуализация надпочечников невозможна, область надпочечника не лоцируется в связи с давлением дополнительного образования, объемные образования гиперэхогенные с эффектом дистальной акустической тени неоднородной структуры округлой формы новообразования в виде конгломерата над позвоночником и крупными сосудами по обе стороны, больше вправо, достигая верхнего полюса правой почки с множеством кальцинатов по периферии образований и в центре – признаки увеличения забрюшинных лимфоузлов, нейрогенное образование забрюшинного пространства. Рентгенография грудной клетки без патологий. В анализе крови показатели в норме. В анализе мочи – патологии не выявлено. Группа крови 1(0) резус отрицательный. HBSAg и геп С - отрицательные. Биохимические показатели – ЛДГ до 9,1, другие без существенных отклонений. Специфический маркер опухоли HCE – 41 мкг/л (норма до 14). Образование располагается по обе стороны от позвоночника, муфтообразно охватывая нижнюю полую вену и аорту, имеет множественные кальцификаты как в центре, так и по периферии, что говорит в пользу его дозревания. Исходя из локализации образования, удалить его полностью в условиях нашей клиники не представляется возможным. Направляется на очная консультация в НИИ ДО г. Москвы для уточнения диагноза и определения тактики дальнейшего лечения.

21.09.04

Леч. вр и зав отделением Привалова Л.П.

